

ผื่นแดงหลังรับวัคซีน Covid-19

ในช่วงปี 2564 มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หลายชนิด และคนไทยได้เริ่มรับการฉีดวัคซีนไปบ้างแล้ว ในหลายท่านยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนนี้เพราะวัคซีนเพิ่งเข้ามาใหม่ ซึ่งส่งผลให้มีคนไข้เข้ารับการปรึกษาเรื่องผื่นที่เกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 บ่อยมากขึ้น

Q: ผื่นแบบไหนบ้างที่สามารถเกิดได้หลังจากการฉีดวัคซีน?

A : ผื่นที่เกิดหลังจากการฉีดวัคซีนนั้นไม่ได้มีลักษณะจำเพาะ ผื่นสามารถขึ้นเป็นตุ่มนูน ผื่นราบเป็นปื้น หรือลมพิษก็ได้ แต่สิ่งที่มีมักจะพบก็คือ ผื่นมักจะขึ้นบริเวณที่ฉีดหรือกระจายไปทั่วตัว โดยผื่นจะขึ้นภายในสัปดาห์แรกหลังจากการได้รับวัคซีน โดยเฉพาะวันที่ 1-3

Q : ผื่นหลังจากการฉีดวัคซีนเป็นอันตรายหรือไม่?

A : ไม่อันตรายค่ะ โดยเป็นผลข้างเคียงที่สามารถพบได้ ผื่นจะค่อยๆ หายไปเองโดยไม่ต้องรับการรักษา ซึ่งจริงๆ แล้วผื่นเหล่านี้สามารถพบได้กับทุกวัคซีน ไม่ใช่เฉพาะวัคซีนโควิด 19 นอกจากนี้ยังสามารถพบอาการปวด บวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีด ไข้ต่ำ อ่อนเพลีย ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัวได้อีกด้วย

Q : ถ้ามีผื่นหลังฉีดวัคซีนควรทำอย่างไร?

A : ไม่ต้องตกใจ แนะนำให้บันทึกไว้ว่าผื่นขึ้นกี่วันหลังจากฉีดวัคซีน ถ่ายรูปเก็บไว้ และพยายามถ่ายรูปไว้ทุกวัน ส่วนใหญ่เป็นผลข้างเคียงของวัคซีน แต่ถ้าหากผื่นเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะเกิน 1 สัปดาห์ไปแล้ว หากกังวลมากก็สามารถมาพบแพทย์ได้ค่ะ

ข้อมูลดีๆ จาก.. พญ.วิภาวัน วัชรนะชัย ตจแพทย์ คลินิกผิวพรรณและความงาม โรงพยาบาลหัวเฉียว