



การรักษาภาวะมีบุตรยาก ด้วยเทคโนโลยีบลาสโตซิสต์คัลเจอร์ (Blastocyst Culture)



การรักษาภาวะมีบุตรยาก ด้วยเทคโนโลยีบลาสโตซิสต์คัลเจอร์ (Blastocyst Culture)

คือการทำการปฏิสนธิของไข่และอสุจิภายนอกร่างกายแล้วเลี้ยงตัวอ่อนต่อไปจนถึงระยะ Blastocyst แล้วจึงใส่กลับคืนสู่โพรงมดลูกเพื่อให้ไปฝังตัวและเกิดเป็นทารกต่อไป การเลี้ยงตัวอ่อนภายนอกร่างกายจนถึงระยะ Blastocyst นั้นต้องใช้ระยะเวลา 5 วัน และจะต้องใช้น้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนตามความต้องการสารอาหารของตัวอ่อนแต่ละระยะ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาสภาวะแวดล้อมในการเลี้ยงตัวอ่อนไว้ภายนอกร่างกายได้นานขึ้น (5-6วัน) จนกระทั่งตัวอ่อนเจริญเติบโตไปถึงระยะ Blastocyst ซึ่งเป็นตัวอ่อนที่มีการพัฒนาไปถึงขั้นสูงสุดก่อนที่จะฝังตัวเกิดเป็นเด็ก และเป็นระยะที่อยู่ในโพรงมดลูกตามธรรมชาติ เมื่อใส่ตัวอ่อนกลับคืนสู่โพรงมดลูก ตัวอ่อนจึงสามารถฝังตัวได้ทันที จึงทำให้อัตราการตั้งครรภ์ของวิธีการนี้สูงกว่าการใส่ตัวอ่อนในระยะอื่นๆทั้งหมด

การทำเทคโนโลยีบลาสโตซิสต์คัลเจอร์ เหมาะกับใครบ้าง

- คู่สมรสที่ฝ่ายหญิงมีปัญหาเรื่องท่อนำไข่ เช่น ท่อนำไข่ตีบ/ตัน ไข่การไม่ได้ หรือกรณีคนที่ทำหมันมาแล้วต้องการมีบุตร
- คู่สมรสที่ฝ่ายชายที่มีปัญหาเรื่องเชื้ออสุจิ
- คู่สมรสที่พยายามมีบุตรด้วยวิธีธรรมชาติเกิน 1 ปี แต่ยังคงไม่สามารถมีบุตรได้ โดยไม่ทราบสาเหตุ

ทั้งนี้คู่สมรสควรได้รับการปรึกษาจากแพทย์เบื้องต้น เพื่อรับทราบถึงข้อจำกัด รวมถึงการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์

ก่อนเริ่มกระบวนการรักษา โดยฝ่ายหญิงจะต้องมีการตรวจประเมินร่างกายเบื้องต้น เพื่อเช็คการทำงานของรังไข่
ท่อนำไข่ และตรวจเช็คสภาพของมดลูกและโพรงมดลูก ส่วนฝ่ายชายจะต้องมีการตรวจเช็คคุณภาพและการทำงานของ
ของอสุจิ ก่อนเริ่มกระบวนการรักษาต่อไป

บทความโดย : นพ.มรว. ทองทิต ทองใหญ่ แพทย์ผู้ชำนาญการสูตินรีแพทย์และรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาล
เวิลด์เมดิคอล ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์ผู้มีบุตรยาก World ART Center @ WMC Hospital ชั้น 4
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โทร. 02-836-9999 ต่อ 4706